



نصائح خاصة بولادة مولود خيل جديد

وقت الولادة

- وجودك وقت الولادة مهم و ضروري لملاحظة أي مشكلة قد تطرأ خلال الولادة.
- الفرس يجب أن تكون في مكان نظيف و آمن و لا تكون قريبة من خيل أخرى خلال الولادة.
- لا تقطع الحبل السري نهائياً - لا تسحب المولود أو تحاول مساعدة الفرس عل النهوض -
اترك الحبل السري ينقطع طبيعياً.
- إذا دعت الحاجة للمساعدة في حال وجود أي مشكلة اسحب الجنين برفق و حذر إلى الأسفل باتجاه قوائم الفرس الخلفية.
- بعد الولادة تفقد الجنين لملاحظة اكتمال عملية الولادة و إذا لم يحدث ذلك ينصح الاتصال بالطبيب البيطري
- يجب دانماً تعقيم الحبل السري و ربطه و بعد عدة ساعات يطهر بمادة الأيودين و الشاش.
- إذا لوحظ نزيف زائد بالحبل السري يتم الضغط لمدة ٥ دقائق بالشاش و الأيودين لوقف النزيف و إذا استمر النزيف يمكن وضع ضمادة مكونة من الأيودين و البيتادين مؤقتاً.
- تأكد من أن المولود يتنفس بشكل طبيعي و إذا لوحظ سوائل تخرج من القصبية الهوائية حاول وضع رأس المولود إلى الأسفل لفترة زمنية لإتاحة الفرصة لخروج كافة السوائل من القصبية الهوائية.
- لاحظ أن المولود يقف على قوائمه طبيعياً خلال (٣٠ دقيقة إلى ساعتين) من الولادة

التغذية

- يقوم المولود بالرضاعة طبيعياً بعد الولادة بحوالي (من ٤ إلى ٦ ساعات) و يكون معدل الرضاعة الطبيعي كل (٣٠ دقيقة) - و يتم تفقد المولود للتأكد من قيامه بالرضاعة بشكل طبيعي و إذا لم يرضع المولود طبيعياً يلاحظ وجود بقايا حليب الأم على وجه المولود و قوائم الفرس الخلفية - إذا خرج الحليب من أنف المهر يجب إيقاف الرضاعة و اتصل بالطبيب البيطري المختص.
- تفقد الفم لملاحظة إذا كان هناك أي عيوب خلقية أو تشوهات - كذلك تفقد لون اللسان فإذا كان اللون يميل إلى البياض مع وجود آلام واضحة يمكن أن تكون عدوى و بالتالي ينصح بتنظيف اللسان من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً باستخدام الأيودين و الاتصال بالبيطري المختص.

الأمراض و المشاكل الصحية

- تفقد عملية التبول - إذا كان البول يأتي من منطقة السرة اتصل بالطبيب البيطري المختص.
- تفقد الإخراج (خصوصاً أول مرة) و تأكد من أن المولود يتبرز بشكل طبيعي - ملاحظة أن أول مرة يتبرز بها المولود تكون من ساعة إلى يوم بعد الولادة - عدم التبرز يؤدي إلى الإمساك و يؤدي إلى ظهور أعراض المغص (عدم الراحة - الدوران - الالتفاف - عدم الرضاعة)
اتصل بالطبيب البيطري المختص.
- إذا لوحظ أن المولود مريض يجب أخذ درجة الحرارة (انخفاض درجة الحرارة خطير جداً) -
درجة الحرارة الطبيعية للمهر (٣٨ - ٣٨,٧ درجة مئوية) - إذا كانت أقل من ٣٦ درجة
- بتدفئة المهر بواسطة استخدام بطانية و الاتصال بالطبيب البيطري المختص مباشرة.
- الاسهال في مواليد الخيل - إذا توقف المولود عن الرضاعة و ظهرت عليه أعراض الاسهال اتصل بالطبيب البيطري المختص.
- العرج - يجب إبقاء المولود بالإسطبل و عدم خروجه إلى البادوك إذا ظهرت أعراض العرج عليه و ذلك للراحة لمدة ٢٤ ساعة و إذا لم تختفي الأعراض أو لوحظ ورم بالمفاصل اتصل بالطبيب البيطري المختص.

ينصح